


Águila de Bonelli o perdicera (*Aquila fasciata*)

Nombre local:
Castellano:.....Águila de Bonelli o águila perdicera o águila-azor perdicera.
Catalán:.....Àguila cuabarrada.
Euskera:.....Bonelli - arranoa.
Gallego:.....Águia perdiceira.
Inglés:.....Bonelli's Eagle.
Francés:.....Aigle de Bonelli.
Italiano:.....Aquila di Bonelli.
Portugués:.....Águia-de-Bonelli.
Nombre científico:
Aquila fasciata (Vieillot, 1822)

Ficha técnica:
Longitud:.....65-72 cm
Envergadura:.....150-160 m
Hembras un 25% mayores que los machos.
Peso: Machos media de 1.940 gr. hembras media 2.615 gr. (rango 1.400-3.025gr) Madurez sexual: 3-4 años (aunque en zonas con baja densidad pueden llegar a criar con éxito al segundo año).

Hábitat: Las parejas territoriales ocupan zonas montañosas, con cantiles o bosques. Los juveniles frecuentan zonas sin adultos territoriales, tranquilas y con abundancia de alimento (áreas esteparias, zonas mixtas de maquia y cultivo).



(★) Reintroducción/Reforzamiento, (R) Población reintroducida.

Mientras otras rapaces se recuperan, el águila de Bonelli sigue disminuyendo, con una población un 35% menor que en la década de 1970. El proyecto AQUILA a-LIFE refuerza las poblaciones al límite de extinción (como Navarra, Álava o Madrid) o ya extinguidas, como la población de Cerdeña y Mallorca. En Mallorca ya se ha logrado reintroducir una población que cuenta con 8 parejas territoriales y 30 individuos.

Estado de conservación: Especie protegida. Mundialmente no amenazada. Población europea concentrada en España, donde se encuentra en declive. 'Vulnerable' según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Movimientos: Sedentaria. Los jóvenes se dispersan durante los primeros años de vida, llevando una vida errática. Algunos pocos atraviesan Gibraltar. Las parejas defienden su territorio todo el año y son poco tolerantes con otros congéneres.



Descripción: Águila de mediano tamaño. Alas cortas y redondeadas, cola larga. Gran maniobrabilidad. Se puede confundir, sobre todo los juveniles, con el águila calzada fase oscura. Plumaje muy variable según la edad: Adultos con el vientre blanco con manchas oscuras y dorso oscuro, con una característica mancha blanca en la espalda y banda negra terminal en la cola; juveniles dorso oscuro y vientre pardo rojizo, que se va aclarando hasta llegar a adulto. Grandes garras.

Mortalidad: La electrocución en apoyos eléctricos es la principal causa, con diferencia; seguida por la persecución directa por parte de cazadores o colimbófilos (disparos) y colisiones contra tendidos eléctricos, vallados, viñedos en espaldera, etc. Molestias en sus territorios de cría, obligan al abandono de nidos.



Cría: Nido en cantil y menos frecuente, en árbol. Suelen tener varios nidos. 1-3 pollos (normalmente 2). Puesta en febrero-marzo; incubación 39-41 días; pollos voladeros con 60 días de edad. Inicio de la dispersión juvenil en agosto-septiembre.



Actuaciones de conservación y recuperación:

Cría en cautividad en los centros de UFCS-LPO en Vendée (Francia) y en GREFA (Madrid).

Traslocaciones de pollos de nidos de poblaciones en buen estado (Andalucía, Sicilia).

Reintroducción de los pollos mediante crianza campestre y de ejemplares no pollos mediante instalaciones de aclimatación.

Seguimiento de las poblaciones reintroducidas mediante telemetría.


Formación y coordinación con sectores clave (autoridades ambientales, autoridades industriales, asociaciones de conservación, empresas eléctricas, agentes medioambientales, investigadores, productores de materiales aislantes, ingenieros industriales, etc.).

Aislamiento y corrección de apoyos eléctricos peligrosos en las principales áreas de campeo, dispersión y reproducción del águila de Bonelli.



Textos de Carlota Viada, GREFA. Diseño e ilustraciones de Ángel Ramón Moya - NATURALEZA ILUSTRADA

Participantes:



Con el apoyo de:

